

## NOTICE

### **DOXYLIS Gé 100mg comprimé sécable**

DOXYCYCLINE

#### **Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

-Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

-Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

- La substance active est

Doxycycline.....100 mg

sous forme de doxycycline monohydratée.

Pour un comprimé sécable.

-Les autres composants sont :

Huile de ricin hydrogénée, povidone K25, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, cellulose microcristalline, carboxyméthylamidon sodique type A.

#### **Titulaire**

##### **Laboratoires Expanscience**

10, avenue de l'Arche  
92419 Courbevoie Cedex - FRANCE  
Tél. : 01 43 34 60 00

#### **Fabricant**

##### **Laboratoires Expanscience**

Rue des Quatre filles  
28230 Epernon - France

#### **1. QU'EST-CE QUE DOXYLIS® Gé 100mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Ce médicament se présente sous forme de comprimé sécable. Boîte de 30.

Ce médicament est un antibiotique de la famille des tétracyclines.

Il est indiqué dans le traitement des infections à germes sensibles à la doxycycline dans leurs manifestations respiratoires, génitales, urinaires, oculaires ou générales.

Votre médecin peut aussi vous le prescrire dans le traitement de certaines formes d'acné ainsi que dans la rosacée dans ses manifestations cutanées ou oculaires.

#### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOXYLIS® Gé 100 mg, comprimé sécable ?**

##### **Ne pas prendre DOXYLIS® Gé 100 mg, comprimé sécable dans les cas suivants :**

-si vous êtes hypersensible (allergique) aux tétracyclines,

-en association avec les rétinoïdes par voie générale (médicaments utilisés pour l'acné) (cf. Prise ou utilisation d'autres médicaments),

-pendant les deuxième et troisième trimestres de la grossesse (cf. Grossesse et allaitement),

-chez l'enfant de moins de huit ans (en raison du risque de coloration permanente des dents et du développement insuffisant de l'émail dentaire),

-en cas d'occlusion intestinale, en raison de la présence d'huile de ricin. Ce médicament est généralement déconseillé pendant l'allaitement.

##### **Prendre des précautions particulières avec DOXYLIS® Gé 100 mg, comprimé sécable :**

-Eviter de vous exposer directement au soleil et aux U.V en raison des risques de sensibilisation à la lumière. Le traitement doit être interrompu en cas d'apparition de rougeurs sur la peau .

-Respecter les conditions de prise du médicament (voir la section "Mode et voie d'administration").

-En raison de la présence d'huile de ricin, risque d'allergie.

-Ce médicament contient 0,533 mg de sodium par comprimé, en tenir compte chez les personnes suivant un régime pauvre en sel, strict.

#### **Grossesse/Allaitement**

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant le premier trimestre de la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'utilisation de ce médicament est contre-indiquée pendant les 2ème et 3ème trimestres de votre grossesse.

En cas de traitement par ce médicament, l'allaitement est déconseillé.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

**Liste des excipients à effet notoire :** huile de ricin hydrogénée, sodium.

**Prise ou utilisation d'autres médicaments :**

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, en particulier les rétinoïdes par voie générale, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

**3. COMMENT PRENDRE DOXYLIS® Gé 100 mg, comprimé sécable ?**

Se conformer à la prescription du médecin traitant. En moyenne, la posologie est de :

-chez l'adulte : 100 à 300 mg par jour,

-chez l'enfant : 4 mg/kg/jour.

Si vous avez l'impression que l'effet de DOXYLIS® Gé 100 mg, comprimé sécable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.



**ATTENTION**

- Les comprimés doivent être avalés **au cours du repas** avec un grand verre d'eau (100 ml)

- Il est important de **ne pas s'allonger** ou de **ne pas se coucher** pendant **l'heure qui suit** la prise des comprimés.

- Ces conditions de prise **sont à respecter** en raison de possibles troubles digestifs, en particulier des **ulcérations de l'œsophage**.

Se conformer à la prescription du médecin traitant.

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites, et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé.

La disparition de la fièvre, ou de tout autre symptôme, ne signifie pas que vous êtes complètement guéri.

L'éventuelle impression de fatigue, n'est pas due au traitement antibiotique mais à l'infection elle-même. Le fait de réduire ou de suspendre votre traitement serait sans effet sur cette impression et retarderait votre guérison.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien

**Si vous avez pris plus de DOXYLIS® Gé 100 mg, comprimé sécable que vous n'auriez dû :** consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien

**Si vous oubliez de prendre DOXYLIS® Gé 100 mg, comprimé sécable :** ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

**4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, **DOXYLIS® Gé 100 mg, comprimé sécable** est susceptible d'avoir des effets indésirables.

- En cas d'administration chez l'enfant de moins de 8 ans, coloration anormale et permanente des dents et développement insuffisant de l'émail dentaire.

- Possibilités de troubles digestifs : ulcérations de l'œsophage (voir la section "Mode et voie d'administration"), nausées, douleurs de l'estomac, diarrhées, perte d'appétit, inflammation de la langue, inflammation de l'intestin, candidoses anogénitales (infections dues à un champignon microscopique).

- En raison de la présence d'huile de ricin : nausées, vomissements, douleurs abdominales.

- Réactions allergiques : urticaire, éruptions, démangeaisons, oedème de Quincke (brusque gonflement du visage et du cou), réaction allergique généralisée grave, trouble cardiaque, aggravation d'un lupus érythémateux pré-existant.

- Photosensibilisation (réaction cutanée lors d'une exposition au soleil ou aux U.V), très rares cas d'érythrodermie (maladie sévère de la peau).

- Possibilité de modifications du bilan sanguin (anémie, baisse des plaquettes ou des globules blancs).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en

informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### **5. COMMENT CONSERVER DOXYLIS® Gé 100 mg, comprimé sécable ?**

Pas de précautions particulières de conservation. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Juin 2005.

#### **6. CONSEILS / EDUCATION SANITAIRE**

##### **Que savoir sur les antibiotiques ?**

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus.

Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique.

Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs.

La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.

Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas :

- la dose à prendre,
- les moments de prise,
- et la durée de traitement.

##### **En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :**

- 1) N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.**
- 2) Respectez strictement votre ordonnance.**
- 3) Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.**
- 4) Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.**
- 5) Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.**