

NOTICE

HYALGAN 20mg/2ml, solution injectable pour voie intra-articulaire en seringue pré-remplie.

Hyaluronate de sodium

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

● DENOMINATION

HYALGAN 20 mg/2 ml, solution injectable pour voie intra-articulaire en seringue pré-remplie.

● COMPOSITION QUALITATIVE/QUANTITATIVE

Hyaluronate de sodium 20 mg
Excipients : Chlorure de Sodium, phosphate monosodique dihydraté, phosphate disodique dodécahydraté,
eau pour préparations injectables q.s.p. 2 ml
pour une seringue de 2 ml.

● FORME PHARMACEUTIQUE

Solution injectable pour voie intra-articulaire en seringue pré-remplie. Boîte d'une seringue pré-remplie (verre).

● CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ARTHROSE.

● NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE

Laboratoires Expanscience
10 avenue de l'Arche 92400 Courbevoie (FRANCE)
01 43 34 60 00

● NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (ITALIE)

DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est préconisé dans l'arthrose douloureuse du genou avec épanchement. Son effet est retardé : la diminution de la douleur est maximale 2 à 3 mois après la première injection.

ATTENTION !

● DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :
-allergie avérée au hyaluronate de sodium et aux substances d'activité proche,
-traitement anticoagulant (risque d'hématome),
-enfants de moins de 16 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

● MISES EN GARDE SPECIALES

-en cas d'insuffisance hépatique,
-en cas de grossesse et d'allaitement, prévenir votre médecin.

● **PRECAUTION D'EMPLOI**

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

● **INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS**

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

● **GROSSESSE – ALLAITEMENT**

GROSSESSE

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état. Demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

ALLAITEMENT

Par mesure de prudence, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allaitement.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MÉDICAMENT.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

● **POSOLOGIE**

Les injections, exclusivement réalisées par un médecin expérimenté, doivent être faites d'une façon rigoureusement aseptique. Il est important d'aspirer avant d'injecter, afin de s'assurer que la pointe de l'aiguille n'est pas dans un vaisseau. La posologie est de 1 infiltration intra-articulaire de 20 mg/2ml par semaine, pendant 5 semaines maximum.

SI VOUS AVEZ L'IMPRESSION QUE L'EFFET DE HYALGAN® 20 mg/2 ml, SOLUTION INJECTABLE POUR VOIE INTRA-ARTICULAIRE EN SERINGUE PRÉ-REPLIEE N'EST PAS CELUI ATTENDU, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

● **MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION**

Voie strictement intra-articulaire. Réservé à l'adulte.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Comme tous les médicaments, HYALGAN® 20mg/2ml, solution injectable pour voie intra-articulaire en seringue est susceptible d'avoir des effets indésirables : ceux-ci sont essentiellement de type douleur locale, fièvre, allergie.

SIGNELEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

A conserver dans son emballage extérieur, à l'abri de la lumière et à une température ne dépassant pas 25°C. Ne pas congeler.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE :

janvier 2004